




PCT/EP200 4 / 0 1 3 3 5 4

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 18,00
Gebührenfrei
gem. § 14, TP 1. Abs. 3
Geb. Ges. 1957 idgF.

Aktenzeichen **A 2051/2003**

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

**die Firma DSM Fine Chemicals Austria Nfg GmbH & CO KG
in A-4021 Linz, St.-Peter-Straße 25
(Oberösterreich),**

am **19. Dezember 2003** eine Patentanmeldung betreffend

**"Verbessertes Verfahren zur Herstellung von chiralen oder
enantiomerenangereicherten beta-Aminosäuren und beta-
Aminoalkoholen",**

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung mit der
ursprünglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung überreichten
Beschreibung übereinstimmt.

**PRIORITY
DOCUMENT**


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Österreichisches Patentamt


Wien, am 27. September 2004

Der Präsident:

i. A.



HRNCIR
Fachoberinspektor



2

5



2


2






Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, ein verbessertes Verfahren zu finden, das von einfacher zugänglichen Allylprodukten ausgeht und das zu den gewünschten beta-Aminosäuren und beta-Aminoalkoholen in deutlich höheren Ausbeuten führt.

Gegenstand der Erfindung ist demnach ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von chiralen oder enantiomerenangereicherten beta-Aminosäuren und beta-Aminoalkoholen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Allylamin der Formel




in der R1 einen C₁-C₂₀-Alkylrest, einen C₃-C₁₂ Cycloalkylrest, einen C₅-C₂₀-Arylrest oder einen C₄-C₂₀-Heterocyclusrest bedeutet, wobei die Reste gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch C₁-C₄-Alkyl, Phenyl, Halogen, C₁-C₆-Carbonsäure-C₁-C₄-alkylester, O-geschützte Hydroxy- oder Hydroxyalkylgruppen substituiert sein können und R2 H oder eine N-Schutzgruppe ist, entweder

a) durch Ozonolyse in einer C₁-C₆-Carbonsäure oder in einem Wasser/Schwefelsäuregemisch bei einer Temperatur von 0 bis 30°C und anschließender Zersetzung der peroxidhaltigen Lösung mittels 1 bis 10 Äquivalenten eines Oxidationsmittel aus der Gruppe H₂O₂, tert-Butylhydroperoxid oder Sauerstoff bei einer Temperatur von 25°C bis zur Siedetemperatur des Lösungsmittels in die entsprechende beta-Aminosäure der Formel




in der R1 und R2 wie oben definiert sind, überführt wird oder



—

Bevorzugt sind dabei C₄-C₁₀-Heterocyclen mit ein bis zwei Heteroatomen aus der Gruppe O, S oder N.



Die Reste können gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein. Geeignete Substituenten sind dabei C₁-C₄-Alkyl, Phenyl, Halogen, C₁-C₆-Carbonsäure-C₁-C₄-alkylester, O-geschützte Hydroxy- und Hydroxyalkylgruppen.

Bevorzugte Substituenten sind C₁-C₂-Alkyl, Phenyl, Fluor, Chlor, C₁-C₃-Carbonsäure-C₁-C₂-alkylester, sowie durch eine Acetylgruppe geschützte Hydroxy- und Hydroxy-C₁-C₄-alkylgruppen.

Besonders bevorzugt bedeutet R₁ einen gegebenenfalls ein- oder zweifach durch Fluor, Chlor, C₁-C₃-Carbonsäure-C₁-C₂-alkylester oder durch eine Acetylgruppe geschützte Hydroxy- oder Hydroxy-C₁-C₄-alkylgruppe substituierten Phenyl- oder Naphthylrest oder C₂-C₆-Alkylrest.

R₂ kann in der Formel (I) H oder eine N-Schutzgruppe bedeuten.

Als N-Schutzgruppen eignen sich alle gängigen N-Schutzgruppen, wie etwa Acetyl, Formyl, Chloroacetyl, Trichloroacetyl, Phenylacetyl, Picolinoyl, Benzoyl, Carbamate wie z.B. Methyl, Ethyl, 9-Fluorenylmethyl, 2,2,2-Trichloroethyl, oder sonstige Schutzgruppen für Amine wie z.B. in Theodora W. Greene, Peter G.M. Wuts Protective Groups In Organic Synthesis; Third Edition, Wiley Interscience beschrieben.

Sind beta-Aminosäuren der Formel (II) die gewünschten Endprodukte, so wird die Verbindung der Formel (I) durch Ozonolyse und anschließender oxidativer Aufarbeitung in die entsprechende beta-Aminosäure überführt. (Variante a)

Dazu wird die Verbindung der Formel (I) zuerst in einer C₁-C₆-Carbonsäure oder in einem Wasser/Schwefelsäuregemisch im Verhältnis 10:1 bis 50:1 aufgenommen und die so erhaltene Reaktionslösung auf eine Temperatur von 0 bis 30°C thermostatisiert.

Als Carbonsäuren werden dabei bevorzugt Essigsäure oder Propionsäure eingesetzt.

Nach beendeter Ozonolyse wird das peroxidhaltige Reaktionsgemisch auf 25°C bis zur Siedetemperatur des Lösungsmittels, bevorzugt auf 50 bis 70°C erwärmt und mit 1 bis 10 Äquivalenten, bevorzugt 4 bis 8 Äquivalenten, eines Oxidationsmittels aus der Gruppe H₂O₂, tert-Butylhydroperoxid oder Sauerstoff versetzt. Bevorzugt wird H₂O₂ in Form einer 30 bis 70%igen Lösung eingesetzt.

Nach beendeter Peroxidzerstörung wird das Lösungsmittel/Wassergemisch abdestilliert und die gewünschte beta-Aminosäure gegebenenfalls durch Umkristallisieren oder Säulenchromatographie gereinigt. Im Falle eines Schwefelsäure/Wassergemisches wird nach beendeter Reaktion mit Lauge (z.B. NaOH) der pH-Wert so eingestellt, dass der isoelektrische Punkt der jeweiligen Aminosäure erreicht wird. Dabei fällt die Aminosäure aus und wird abfiltriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet.


Die gewünschten beta-Aminosäuren werden dabei in Ausbeuten von bis zu 99% d.Th. erhalten. Der Enantiomerenüberschuss der so erhaltenen beta-Aminosäuren entspricht dem der eingesetzten Verbindung der Formel (I).

Sind die beta-Aminoalkohole der Formel (III) die gewünschten Endprodukte, so wird die Verbindung der Formel (I) durch Ozonolyse und anschließender reduktiver Aufarbeitung in dieselben überführt.

Dazu wird die Verbindung der Formel (I) zuerst in einem C₁-C₆-Alkohol oder in Butylacetat oder Ethylacetat oder Gemischen davon aufgenommen und die so erhaltene Reaktionslösung auf eine Temperatur von -40 bis 0°C, bevorzugt auf -30 bis -10°C thermostatisiert.

Als Alkohol werden dabei bevorzugt Methanol oder Butanol eingesetzt.

Anschließend erfolgt die Umsetzung mit Ozon, wobei Ozon in einer Menge von 1 bis 2 Äquivalenten in Form eines Ozon/Sauerstoffstromes zugeführt wird.



Nach beendeter Ozonolyse erfolgt die reduktive Aufarbeitung. Als Reduktionsmittel können dabei NaBH_4 , (R)-Alpine borane®, L-Selectride® oder andere komplexe Hydride mit oder ohne chiralen Liganden eingesetzt werden.


Dabei wird die Reaktionslösung in eine alkoholische Lösung, welche das Reduktionsmittel enthält, zugegeben. Als Alkohol für die alkoholische Natriumborhydridlösung wird bevorzugt der Alkohol eingesetzt, der auch als Lösungsmittel für die Ozonolyse verwendet wird.

Die Menge an Reduktionsmittel beträgt dabei 1 bis 4 mol pro mol Allylverbindung der Formel (I). Bevorzugt werden 1 bis 2 mol pro mol Allylverbindung der Formel (I) eingesetzt.

Anschließend wird die Reaktionslösung auf 10 bis 40°C, bevorzugt auf 20 bis 30°C erwärmt und mit 1-2 Äquivalenten Wasser, bezogen auf das Reduktionsmittel versetzt, um überschüssiges Reduktionsmittel zu zerstören.

Danach wird das Lösungsmittel abdestilliert und der Rückstand durch übliche Extraktionsmittel, wie etwa Dichlormethan, Ethylacetat, Butylacetat, MTBE ein- bis 5mal extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden getrocknet, filtriert und abschließend vom Extraktionsmittel befreit. Gegebenenfalls können die beta-Aminoalkohole noch durch Umkristallisieren oder Säulenchromatographie gereinigt werden.

Die gewünschten beta-Aminoalkohole werden dabei in Ausbeuten von bis zu 93% d.Th. erhalten. Der Enantiomerenüberschuss der so erhaltenen beta-Aminoalkohole entspricht dem der eingesetzten Verbindung der Formel (I).



Beispiel 1-7:

Arbeitsvorschrift für die Herstellung von chiralen Aminoalkoholen

0,04 mol ungeschütztes Allylamin wurden in 200 ml Methanol aufgenommen. Die Lösung wurde in ein Doppelmantelgefäß chargiert und auf -20°C abgekühlt. Nachdem ein konstanter Ozon/Sauerstoffstrom von 20 g/Nm^3 eingestellt wurde, wurde mit der Ozonolyse begonnen. Nach beendeter Ozonolyse wurde die Reaktionslösung in eine eisgekühlte methanolische Natriumborhydridlösung (0,09 mol, 100 ml) innerhalb von 10 Minuten zugetropft. Danach wird die Reaktionslösung auf Raumtemperatur erwärmt und mit 10 ml Wasser versetzt, um überschüssiges Natriumborhydrid zu zersetzen. Danach wurde das Lösungsmittel abdestilliert und der Rückstand mit Dichlormethan mehrmals extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte wurden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und danach das Lösungsmittel abdestilliert. Gegebenenfalls wurde das erhaltene Produkt durch Umkristallisation oder Säulenchromatographie gereinigt.

Beispiel 1:

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-phenyl-1-buten

Produkt: (*R*)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol wurde in 93 % Ausbeute und einen 99 % Enantiomerenüberschuss erhalten


Weisse Kristalle ; mp $73 - 74^{\circ}\text{C}$;

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.86 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 3.76 (t, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 4.10 (t, 1H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 7.21 – 7.35 (m, 5H, Ar-H)

Beispiel 2:

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-(4-pyridyl)-1-buten

Produkt: (*R*)-3-Amino-3-(4-pyridyl)-1-propanol



Ausbeute (nach Säulenchromatographie): 69 %

Enantiomerenüberschuss 40 %

Gelbes Öl; $[\alpha]_D = 33.24$ ($c = 1.02$ g / ml, chloroform);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.95 (s, 3H, Ac-CH₃), 2.07 (s, 3H, Ac-CH₃), 2.18 (m, 2H, -CH₂CH₂OAc), 4.00 – 4.20 (m, 2H, -CH₂CH₂OAc), 5.13 (m, 1H, -CH(NHAc)-), 7.26 – 8.50 (m, 4H, Pyr-H), 8.61 (br s, 1H, -NHAc) ppm;

$^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) 20.8 (Ac-CH₃), 22.9 (Ac-CH₃), 34.5 (-CH₂CH₂OAc), 48.5 (-CH(NHAc)-), 60.9 (-CH₂CH₂OAc), 123.9 (Pyr-C), 134.5 (Pyr-C), 138.0 (Pyr-C), 148.4 (Pyr-C), 148.5 (Pyr-C), 170.2 (Ac-CO), 170.9 (Ac-CO) ppm.

Beispiel 3

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1-buten

Produkt: (*R*)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1-propanol

Ausbeute: 83 %

Enantiomerenüberschuss 87 %:

Weißer Kristalle; mp 141 - 142 °C; $[\alpha]_D = 22.61$ ($c = 1.99$ g / ml, chloroform);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.84 (m, 2H, -CH₂CH₂OH), 3.17 (br s, 3H, -OH, -NH₂), 3.70 (m, 2H, CH₂CH₂OH), 4.10 (t, 1H, -CH(NH₂)-), 6.91 – 7.29 (m, 4H, Ar-H) ppm;

$^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) 40.2 (-CH₂CH₂OH), 54.8 (-CHNH₂), 60.7 (-CH₂CH₂OH), 112.8 – 113.2 (Ar-C Pos. 4), 113.8 – 114.2 (Ar-C Pos. 6), 121.7 (Ar-C Pos. 3), 129.8 (Ar-C Pos. 2), 148.6 (Ar-C Pos. 1), 161.4 – 164.7 (Ar-C Pos. 5) ppm.


Beispiel 4:

Ausgangsverbindung: (*R*)-N-Acetyl-4-amino-4-phenyl-2-methyl-1-buten

Produkt: (*R*,±)-N-Acetyl-4-Amino-4-phenyl-2-butanol

Ausbeute: 84 %

Weißer Feststoff; mp 87 - 88 °C; $[\alpha]_D = 100.54$ ($c = 1.85$ g / ml, chloroform);



$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.16 (d, 3H, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 1.78 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 1.95 (s, 3H, Ac-CH_3), 3.76 (m, 1H, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 4.01 (br s, 1H, $-\text{OH}$), 4.95 – 5.18 (ddd, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 7.07 (m, 1H, $-\text{NHAc}$), 7.20 – 7.32 (m, 5H, Ar-H) ppm;
 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) □ 23.0 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 23.1 (Ac-CH_3), 45.2 ($-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 51.0 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 63.9 ($-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 126.6 (Ar-C), 127.4 (Ar-C), 128.6 (Ar-C), 141.5 (Ar-C), 171.0 (Ac-CO) ppm.

Beispiel 5:

Ausgangsverbindung: (R)-N-Acetyl-4-amino-4-phenyl-2-methyl-1-buten

Produkt: (R,R)-N-Acetyl-4-Amino-4-phenyl-2-butanol

Reduktion der Peroxidlösung wurde mit (R)-Alpine borane® , und mit L-Selectride® durchgeführt in Analogie zur Reduktion mit Natriumborhydrid.

Ausbeute nach Umkristallisation (aus Acetonitril) 76 %.

L-Selectride®: Diastereomerenverhältnis 1 : 3.

(R)-Alpine borane®: Diastereomerenverhältnis 1:2.

Farbloses Öl; $[\alpha]_D = 53.88$ ($c = 2.06$ g / ml, chloroform);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.07 (m, 3H, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 1.43 – 1.71 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 1.89 (s, 3H, Ac-CH_3), 3.51 (m, 1H, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$), 4.32 and 4.49 (2 s, 1H, $-\text{OH}$), 4.94 (m, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 7.20 – 7.37 (m, 5H, Ar-H), 8.21 – 8.30 (2 d, 1H, $-\text{NHAc}$) ppm.

Beispiel 6:

Ausgangsverbindung: (R)-N-Acetyl-4-Amino-5-methyl-1-hexen


Produkt: (R)-N-Acetyl-3-Amino-4-methyl-1-pentanol

Ausbeute: 93 %

Enantiomerenüberschuss: 89 %:

Weisse Kristalle; mp 67 °C; $[\alpha]_D = 11.29$ ($c = 1.86$ g / ml, chloroform);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 0.94 (dd, 6H, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 1.33 (m, 1H, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 1.71 – 1.87 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 2.03 (s, 3H, Ac-CH_3), 3.57 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 3.83 (m, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 3.96 (br s, 1H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 6.04 (d, 1H, CH-NHAc) ppm;



^{13}C -NMR (CDCl_3) 18.9 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 19.7 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 23.4 ($\text{Ac}-\text{CH}_3$), 32.3 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 35.5 ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 51.9 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 59.2 ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 172.0 ($\text{Ac}-\text{CO}$) ppm.

Beispiel 7:

Ausgangsverbindung: (R)-N-Acetyl-4-amino-4-phenyl-2-methyl-1-buten

Produkt: (R)-N-Acetyl-4-amino-4-phenyl-butan-2-one


Ausbeute: 76 %

Enantiomerenüberschuss: 97 %:

Weißer Kristalle ; mp 77 - 78 °C; $[\alpha]_D = 50.94$ ($c = 2.12$ g / ml, chloroform);

^1H -NMR (CDCl_3) 1.95 (d, 3H, $-\text{CO}-\text{CH}_3$), 2.07 (s, 3H, $\text{Ac}-\text{CH}_3$), 2.77 – 3.07 (ddd, 2H, $-\text{CH}_2\text{COCH}_3$), 5.37 (dd, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 7.04 (d, 1H, $-\text{NHAc}$), 7.20 – 7.32 (m, 5H, Ar-H) ppm;

^{13}C -NMR (CDCl_3) 23.2 ($\text{Ac}-\text{CH}_3$), 30.5 ($-\text{CH}_2\text{COCH}_3$), 48.6 ($-\text{CH}_2\text{COCH}_3$), 49.6 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 126.4 (Ar-C), 127.7 (Ar-C), 128.9 (Ar-C), 141.1 (Ar-C), 169.6 ($\text{Ac}-\text{CO}$), 207.3 ($-\text{COCH}_3$) ppm.



Beispiel 8-11:

Arbeitsvorschrift für die Herstellung von chiralen beta-Aminosäuren

0.02 mol Acetyl-geschütztes Allylamin wurde in 200 ml Essigsäure (technische Qualität) aufgenommen. Die Reaktionslösung wurde auf 18°C thermostatisiert. Es wurde mit einem Ozon/Sauerstoffstrom mit einer Ozonkonzentration von 20 g / Nm³/h ozonisiert. Nachdem die Ozonolyse beendet war, wurde das Reaktionsgemisch auf 60°C erhitzt und mit 6 Äquivalenten Wasserstoffperoxid (50%, technische Qualität) versetzt. Nach 2-3 Stunden war die Reaktion beendet. Das Essigsäure/Wassergemisch wurde abdestilliert. Das Produkt wurde, falls notwendig, durch Umkristallisation aus Acetonitril oder Säulengromatographisch gereinigt.

Beispiel 8:

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-phenyl-1-buten

Produkt: (*R*)-*N*-Acetyl- β -phenyl- β -alanine

Ausbeute: 97 %

Enantiomerenüberschuss: 99 %,

Weißer Kristalle; mp 198 °C; $[\alpha]_D = 84.30$ ($c = 1.5$ g / ml, ethanol);

¹H-NMR (DMSO-d₆) 1.83 (s, 3H, Ac-CH₃), 2.68 (m, 2H,), 5.21 (m, 1H,), 7.21 – 7.33 (m, 5H,), 8.38 (d, 1H,), 12.26 (br s, 1H,) ppm;


¹³C-NMR (DMSO-d₆) 23.0 (Ac-CH₃), 41.3 (-CH₂-COOH), 49.8 (-CH(NHAc)-), 126.8 (Ar-C), 127.3 (Ar-C), 128.6 (Ar-C), 143.0 (Ar-C), 168.6 (-COOH), 172.1 (Ac-CO) ppm.

Beispiel 9:

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-(4-pyridyl)-1-buten

Produkt: (*R*)-*N*-Acetyl-3-(4-pyridyl)-3-aminopropionic acid

Ausbeute: 96 %



Enantiomerenüberschuss: 40 %

Hellgelbe Kristalle; mp 82 - 83 °C; $[\alpha]_D = 8.24$ ($c = 2.55$ g / ml, water);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.89 (s, 3H, Ac- CH_3), 2.36 (t, 2H, $-\text{CH}_2\text{COOH}$), 5.00 – 5.15 (m, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 7.30 – 8.55 (m, 4H, Pyr- H), 8.93 (m, 1H, $-\text{NHAc}$) ppm;

$^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) 24.3 (Ac- CH_3), 26.9 ($-\text{CH}_2\text{COOH}$), 50.3 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 124.6 (Pyr-C), 135.5 (Pyr-C), 148.8 (Pyr-C), 149.8 (Pyr-C), 169.6 (Ac-CO), 176.4 ($-\text{COOH}$) ppm.

Beispiel 10:

Ausgangsverbindung: (*R*)-4-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1-buten

Produkt: (*R*)-*N*-Acetyl-3-(4-fluorophenyl)-3-aminopropionic acid

Ausbeute: 99 %

Enantiomerenüberschuss: 89 %:

Weiß Kristalle; mp 33 °C; $[\alpha]_D = 69.60$ ($c = 2.27$ g / ml, methanol);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 1.85 (s, 3H, Ac- CH_3), 2.67 (d, 2H, $-\text{CH}_2\text{COOH}$), 5.22 (m, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 7.01 – 7.39 (m, 5H, Ar- H), 8.40 (d, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$) ppm;

$^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) 23.4 (Ac- CH_3), 41.6 ($-\text{CH}_2\text{COOH}$), 50.0 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 114.0 (Ar-C), 114.4 (Ar-C), 123.4 (Ar-C), 130.9 (Ar-C), 146.5 (Ar-C), 161.4-164.6 (Ar-C), 169.3 (Ac-CO), 172.4 ($-\text{COOH}$) ppm.

Beispiel 11:

Ausgangsverbindung: (*R*)-*N*-Acetyl-4-Amino-5-methyl-1-hexen

Produkt: (*R*)-*N*-Acetyl-3-amino-4-methyl-pentanoic acid

Ausbeute nach Säulenchromatographie: 58 %

Enantiomerenüberschuss 98 %


Gelbe Kristalle; mp 84 - 85 °C; $[\alpha]_D = -29.03$ ($c = 2.17$ g / ml, chloroform);

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) 0.93 (s, 6H, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 2.00 (m, 3H, Ac- CH_3), 2.56 (s, 2H, $-\text{CH}_2\text{COOH}$), 4.05 (s, 1H, $-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 6.74 (br s, 1H, $-\text{NHAc}$) ppm;

$^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) 18.9 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 19.2 ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$), 23.0 (Ac- CH_3), 40.2 ($-\text{CH}_2\text{COOH}$), 51.9 ($-\text{CH}(\text{NHAc})-$), 171.3 (Ac-CO), 175.7 (CH_2COOH) ppm.


Patentansprüche:

1. Verbessertes Verfahren zur Herstellung von chiralen oder enantiomerenangereicherten beta-Aminosäuren und beta-Aminoalkoholen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Allylamin der Formel



in der R1 einen C₁-C₂₀ Alkylrest, einen C₃-C₁₂-Cycloalkylrest, einen C₅-C₂₀-Arylrest oder einen C₄-C₂₀-Heterocyclusrest bedeutet, wobei die Reste gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch C₁-C₄-Alkyl, Phenyl, Halogen, C₁-C₆-Carbonsäure-C₁-C₄-alkylester, O-geschützte Hydroxy- oder Hydroxyalkylgruppen substituiert sein können und R2 H oder eine N-Schutzgruppe ist, entweder


- a) durch Ozonolyse in einer C₁-C₆-Carbonsäure oder in einem Wassers/Schwefelsäuregemisch bei einer Temperatur von 0 bis 30°C und anschließender Zersetzung der peroxidhaltigen Lösung mittels 1 bis 10 Äquivalenten eines Oxidationsmittel aus der Gruppe H₂O₂, tert-Butylhydroperoxid oder Sauerstoff bei einer Temperatur von 25°C bis zur Siedetemperatur des Lösungsmittels in die entsprechende beta-Aminosäure der Formel



in der R1 und R2 wie oben definiert sind, überführt wird oder

- b) durch Ozonolyse in einem Lösungsmittel aus der Gruppe C₁-C₄-Alkohol, Ethylacetat oder Butylacetat oder in Gemischen davon, bei einer Temperatur von

–40 bis 0°C und anschließender reduktiver Aufarbeitung in den entsprechenden beta-Aminoalkohol der Formel



in der R1 und R2 wie oben definiert sind überführt wird.


2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante a) als Lösungsmittel für die Ozonolyse Essigsäure oder Propionsäure eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante a) nach beendeter Ozonolyse das peroxidhaltige Reaktionsgemisch auf 50 bis 70°C erwärmt wird und mit 4 bis 8 Äquivalenten an H₂O₂ versetzt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante a) nach beendeter Peroxidzerstörung das Lösungsmittel/Wassergemisch abdestilliert wird und die beta-Aminosäure gegebenenfalls durch Umkristallisieren oder Säulenchromatographie gereinigt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante b) als Lösungsmittel für die Ozonolyse Methanol oder Butanol eingesetzt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante b) als Reduktionsmittel NaBH₄, (R)-Alpine borane®, L-Selectride® oder andere komplexe Hydride mit oder ohne chiralen Liganden eingesetzt werden.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante b) 1 bis 4 mol an Reduktionsmittel pro mol Allylverbindung der Formel (I) eingesetzt werden.

15

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante b) nach beendeter reduktiver Aufarbeitung die Reaktionslösung auf 10 bis 40°C erwärmt wird und 1 bis 2 Äquivalente an Wasser bezogen auf das Reduktionsmittel zugesetzt werden um überschüssiges Reduktionsmittel zu zerstören.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Variante b) die Isolierung des beta-Aminoalkohols durch Extraktion erfolgt, wobei der beta-Aminoalkohol gegebenenfalls noch durch Umkristallisieren oder Säulenchromatographie gereinigt wird.


O.Z.1267
15.12.2003

Lindinger
DSM Fine Chemicals Austria Nfg GmbH & Co KG




Zusammenfassung

Verbessertes Verfahren zur Herstellung von chiralen oder enantiomerenangereicherten beta-Aminosäuren und beta-Aminoalkoholen, bei welchem ein Allylamin der Formel




in der R1 einen gegebenenfalls substituierten C₁-C₂₀ Alkylrest, einen C₃-C₁₂-Cycloalkylrest, einen C₅-C₂₀-Arylrest oder einen C₄-C₂₀-Heterocyclusrest bedeutet, und R2 H oder eine N-Schutzgruppe ist, entweder

a) durch Ozonolyse in einer C₁-C₆-Carbonsäure oder in einem Wassers/Schwefelsäuregemisch bei einer Temperatur von 0 bis 30°C und anschließender Zersetzung der peroxidhaltigen Lösung bei einer Temperatur von 25°C bis zur Siedetemperatur des Lösungsmittels in die entsprechende beta-Aminosäure der Formel



überführt wird, oder

b) durch Ozonolyse in einem Lösungsmittel aus der Gruppe C₁-C₄-Alkohol, Ethylacetat oder Butylacetat oder in Gemischen davon, bei einer Temperatur von -40 bis 0°C und anschließender reduktiver Aufarbeitung in den entsprechenden beta-Aminoalkohol der Formel



überführt wird.

